

MINISTERE DES TRANSPORTS, DE LA MOBILITE  
URBAINE ET DE LA SECURITE ROUTIERE

BURKINA FASO

SECRETARIAT GENERAL

UNITE - PROGRES - JUSTICE

DIRECTION GENERALE DE LA METEOROLOGIE

01 B.P. 576 OUAGADOUGOU 01  
TEL:25-35-60-32

# Bulletin Agrométéorologique Décadaire

N°20

PÉRIODE DU 11 AU 20 JUILLET 2016



## SOMMAIRE


- ⊕ présence des vents de mousson sur la majeure partie du pays;
- ⊕ hausse des températures moyennes et de l'humidité moyenne relative sous abri par rapport à la normale 1981-2010 sur la majeure partie du pays;
- ⊕ situation agricole ;
- ⊕ suivi de la végétation par satellite ;
- ⊕ perspectives de la semaine
- ⊕ mise à jour de la prévision saisonnière de pluviométrie 2016
- ⊕ conseils pratiques à quelques secteurs d'activités.

## I Situation pluviométrique

*La deuxième décennie du mois de juillet 2016 a été caractérisée par le maintien d'une activité de mousson faible à modérée sur l'ensemble du pays. Cette activité de la mousson s'est traduite par des manifestations pluvio-orageuses qui ont permis d'enregistrer des quantités de pluie variables. Les cumuls de pluie décennaires ont varié entre 23.2 mm à Niangoloko et 196.0 mm à Gourcy. Pour ce qui concerne les cumuls saisonniers du 1<sup>er</sup> avril au 20 juillet 2016, ils ont évolué entre 100.6 mm à Baraboulé et 590.7 mm à Orodara.*


La deuxième décennie du mois de juillet 2016 a été caractérisée par une activité de la mousson faible à modérée. Des manifestations pluvio-orageuses ont été observées sur la majeure partie du pays. Au cours de cette période, la pluviométrie a été faible à modérée et surtout mal répartie dans le temps et dans l'espace. Les hauteurs de pluie décennaires ont été pour la plupart supérieures à 50 mm. La hauteur maximale de pluie décennaire a été enregistrée à **Gourcy** dans la province du **Zondoma** avec **196.0 mm** en **5 jours** contre **23.2 mm** à Niangoloko en **3 jours** dans la **Comoé** (figure 1).

Comparés à la normale (moyennes 1981-2010) pour la même période, **les cumuls pluviométriques décennaires ont été similaires à excédentaires** sur la majeure partie du pays. Par contre certaines localités de l'Est et des Cascades ont connu **un déficit pluviométrique** (figure 2).




Les cumuls pluviométriques saisonniers du 1<sup>er</sup> avril au 20 juillet 2016 ; ils ont varié entre **100.6 mm** en **6 jours** de pluie à **Baraboulé**, dans la province du **Soum** et **590.7 mm** en **32 jours** de pluie à **Orodara**, dans le **Kéné Dougou** (figure 3).

Ces cumuls pluviométriques saisonniers comparés à la normale (moyennes 1981-2010), **ont été similaires à excédentaires** sur la majeure partie du pays, exception faite de certaines localités de l'Est et du Sud-ouest qui ont connu une situation **pluviométrique déficitaire** (figure 4).




**Figure 3 :** Cumul pluviométrique saisonnier du 01 avril au 20 juillet 2016



**Figure 4 :** Rapport du cumul pluviométrique du 1<sup>er</sup> avril au 20 juillet 2016 et la normale 1981-2010

Les cumuls pluviométriques saisonniers comparés à ceux de l'année précédente, pour cette même période **ont été excédentaires à très excédentaires** sur la quasi-totalité du pays, excepté certaines localités des provinces du Soum, de la Kompienga et de la Tapoa qui ont connu un **déficit pluviométrique** (figure 5).




**Figure 5 :** Rapport du cumul pluviométrique du 1<sup>er</sup> avril au 20 juillet 2016 et celui de l'année précédente.

## II Situation Agrométéorologique

*Les températures moyennes et les humidités relatives sous abri ont subi une hausse par rapport à la normale (moyenne 1981-2010) sur la majeure partie du pays.*

### 2.1 Evolution de la température moyenne sous abri


Les températures moyennes sous abri ont connu une baisse par rapport à la décade précédente. Elles ont oscillé de 26.0°C à Bobo-Dioulasso et à Gaoua à 30.1°C à Dori (figure 6).



Par rapport à la moyenne (1981-2010) de la même période, ces températures ont été en hausse sur la totalité des stations météorologiques (figure 7).

## 2.2 Evolution de l'humidité relative moyenne

Les valeurs d'humidité relative moyenne sous abri ont connu une hausse par rapport à la décade précédente. Elles ont oscillé entre 65% à Dori dans le Sahel et 86% à Niangoloko dans les Cascades (fig. 8). Comparées à la normale (moyenne 1981-2010), ces valeurs ont été en hausse sur la presque totalité du pays (fig. 9).



### III Situation agricole

A la deuxième décennie du mois de juillet 2016, les opérations culturales prépondérantes sont le sarclage, l'apport des fumures organiques et du compost dans les champs. Quelques cas de semis sont toujours observés par endroits

Pour l'ensemble du pays, le stade phénologique dominant est la levée pour les céréales. Les légumineuses telles que l'arachide, le niébé sont à plus 50% de réalisation. Dans les régions des Hauts-Bassins, du Sud-ouest et des Cascades, les céréales sont majoritairement au stade de montaison. Les premiers semis de maïs sont à l'épiaison, voire début maturation au Sud-ouest.

La figure 10 ci-dessous indique les différentes dates d'installation moyenne de la saison des pluies (1 année sur 2).





Figure 10 : dates de début climatologiques moyennes de la saison des pluies

### IV Situation de la végétation

#### Evolution des indices différentiels normalisés de végétation (NDVI)

Les indices différentiels normalisés de végétation présentent une végétation dense à très dense dans la zone soudanienne du pays, clairsemée à moyennement dense dans la zone soudano-sahélienne, clairsemée avec par endroits des pages dénudés dans la zone sahélienne (fig.11).

Comparés à la moyenne 2001-2010 pour la même période, ces indices révèlent une nette amélioration de la croissance végétative sur la majeure partie du territoire. Il existe cependant, dans quelques localités du pays, des endroits où le couvert végétal a connu un retard, notamment au sud-est, à l'extrême ouest et nord du pays (fig.12).



**Fig. 11:** Indice Différentiel Normalisé de Végétation à la deuxième décennie de juillet 2016

**Fig. 12:** Anomalie du NDVI par rapport à la moyenne 2001-2010 à la deuxième décennie de juillet 2016

## V. Perspectives pour la période du lundi 25 au dimanche 31 juillet 2016

Au cours de la semaine, la mousson restera active sur le pays. En effet, on observera fréquemment des manifestations pluvieuses ou pluvio-orageuses isolées au cours des après-midi ainsi que l'évolution d'amas pluvio-orageux sur la majeure partie du territoire.

Les cumuls pluviométriques hebdomadaires attendus sur les différentes localités du pays se situent entre 01 et 135 mm. Les plus importantes quantités seront enregistrées au nord, à l'ouest et à l'est du pays (**figure. 13**).






Figure 13 : Cumul pluviométrique attendu pour la période du 26 au 31 juillet 2016

Les températures minimales moyennes varieront entre 20°C et 26°C tandis que les maximales oscilleront entre 25°C et 35°C (figures 14 et 15).



**Figure 14**



**Figure 15**

## **VI Prévision saisonnière de pluviométrie 2016 (mise à jour pour la partie cumuls pluviométriques)**

*Il est prévu un cumul pluviométrique normal à excédentaire dans la région du Sahel pour la période JAS 2016. Au plan national, une pluviométrie excédentaire à tendance normale est attendue pour la même période JAS 2016. Pour la période ASO 2016, une pluviométrie supérieure ou égale à la normale est attendue sur le pays. Cependant, le caractère excédentaire sera moindre dans les régions des Hauts-Bassins, des Cascades et du Sud-ouest.*

### **Introduction**

Les variations de la température de la surface de la mer (SST) de certains bassins océaniques jouent un rôle majeur sur les conditions pluviométriques à l'échelle du globe. Cette téléconnection entre les SST et la pluviométrie est un maillon important dans la prévision saisonnière des pluies en Afrique de l'Ouest. En effet, les anomalies SST au niveau du globe et particulièrement celles de l'Océan Pacifique (connu sous le nom d'ENSO) et de l'Atlantique sont utilisées comme prédicteurs dans le processus de caractérisation de la saison d'hivernage lors de la Prévision Saisonnière pour les pays Soudano-Sahéliens (PRESASS).

Les observations des SST du mois de juin sur l'Océan Pacifique montrent une situation ENSO neutre. Une situation similaire est observée sur l'Atlantique. Pour les mois à venir, la plupart des modèles de prévision du climat prévoit un renforcement progressif du phénomène La

Niña, situation favorable à une bonne précipitation sur le Sahel. Sur l’Océan Atlantique, il est prévu une situation globalement neutre. Il est à noter que les prévisions SST sur l’atlantique notamment la configuration du dipôle « Golfe de guinée– côtes Sénégal-Mauritaniennes » varie significativement selon les modèles de prévision climatique.

## Prévision au plan national

### 6.1 Cumul pluviométrique des périodes juillet-août-septembre (JAS) et août-septembre-octobre (ASO) 2016

La mise à jour des résultats de la prévision saisonnière 2016 portent sur les tendances probables des cumuls pluviométriques pour les périodes juillet-août-septembre (JAS) et août-septembre-octobre (ASO) 2016.

La prévision de JAS 2016 prévoit une situation globalement humide sur l’ensemble du territoire national, avec un effet moindre pour la région du Sahel. En effet, sur la période JAS 2016, un cumul pluviométrique normal à excédentaire est attendu dans la région du Sahel tandis que pour le reste du pays, il est prévu une situation pluviométrique excédentaire à tendance normale (cf. figure 16).




Figure 16 : Prévision saisonnière du cumul pluviométrique JAS 2016

Il est prévu pour la période ASO 2016 des cumuls pluviométriques supérieurs à la normale

sur l'ensemble du territoire. En effet un cumul pluviométrique normal à tendance excédentaire est attendu dans les régions des Hauts Bassins, des Cascades et du Sud-ouest.

Pour le reste du pays, il est prévu un cumul pluviométrique excédentaire avec une tendance à la normale (cf. figure 17)




Figure 17 : Prévision saisonnière du cumul pluviométrique ASO 2016

## 6.2. Dates de début de la saison des pluies

Les résultats de ces prévisions saisonnières des paramètres agro-climatiques font ressortir deux périodes de dates d'installation probables de la saison des pluies agricoles (Figure 19). Ces périodes d'installation sont suivies des tendances possibles, dans le cas de non réalisation de l'évènement qui a la plus forte probabilité:

- ✓ Une installation précoce, c'est-à-dire avant le 15 mai dans la zone soudanienne, avant le 05 juin dans la partie soudano-sahélienne.
  - Une tendance moyenne, c'est à dire à partir du 15 mai dans la zone soudanienne; à partir du 21 mai pour la zone soudano-sahélienne.
- ✓ Une installation moyenne c'est à dire à partir du 10 juin dans la partie sud de la zone sahélienne
  - Une tendance tardive c'est-à-dire après le 15 juin à partir de la partie sud de la zone sahélienne




Figure 19: dates probables de début de la saison des pluies

### 6.3. Dates de fin de la saison des pluies

A l’instar des dates d’installation de la saison des pluies, la fin de la saison des pluies se présente en deux périodes avec des tendances, selon les zones (Figure 20).

- ✓ Une première période avec **une fin tardive** c’est-à-dire après le 20 septembre dans la partie Nord du pays, après le 10 octobre dans le Centre du pays;
  - à tendance normale c’est-à-dire à partir du 10 septembre pour le Nord; du 1er octobre pour le Centre et à partir du 21 octobre pour le Sud du pays.
- ✓ fin précoce c’est-à-dire avant le 05 octobre dans la partie Sud du pays;
  - à tendance moyenne ce qui signifie à partir du 21 octobre




Figure 20 : Tendances probables des dates de fin de la saison des pluies

#### 6.4 Séquences sèches après les semis

- ✓ moins longues que les moyennes c'est-à-dire inférieures à 9 jours dans le Nord et le Centre du pays;
  - à équivalentes à la moyenne c'est-à-dire environ 9 jours dans le Nord et le Centre du pays (fig. 21).
- ✓ plus longues que la moyenne c'est-à-dire supérieures à 7 jours dans l'extrême sud de la zone soudano-sahélienne et la zone soudanienne du pays;
  - à tendance normale ce qui signifie équivalentes à 5 jours environ dans ces zones




Figure 21 : Durées probables des séquences sèches en début de saison des pluies

## 6.5. Séquences sèches vers la fin de la saison

- ✓ moyennes c'est-à-dire à environ 9 jours dans la moitié Est du pays et 7 jours dans le Sud-ouest;
  - à tendance plus courtes que la moyenne c'est-à-dire inférieures à 9 jours dans la moitié Est et 7 jours dans le Sud-ouest
- ✓ plus longues que les moyennes c'est-à-dire supérieures à 9 jours dans la partie sahélienne et soudano-sahélienne et 7 jours dans la partie soudanienne du pays;
  - à tendance plus courtes que les moyennes c'est-à-dire inférieures à 9 jours dans la partie sahélienne et soudano-sahélienne et 7 jours dans la zone soudanienne (fig. 22).




Figure 22 : Durées probables des séquences sèches en fin de saison des pluies

## VII. Quelques conseils pratiques à certains secteurs d'activités

Au regard de la pénétration de la mousson sur le pays, nous assisterons à une hausse de la température liée à une présence élevée de l'humidité contenue dans l'air. Il s'avère important de prendre en compte ces quelques conseils pratiques ci-après :

## 1. Agriculture

Selon les réalisations d'évènements de pluviométrie possibles :

### A

- **Cumuls pluviométriques excédentaires à normaux ou normaux à excédentaires en JJA et JAS**
  - **Installation précoce à normale de la saison des pluies**
  - **Séquences sèches longues en début de saison**
  - **Fin tardive de la saison des pluies**
- ✓ Utiliser des calendriers prévisionnels des dates de semis précoces
  - ✓ Investir davantage dans les semences des variétés améliorées à cycle long ou moyen et résistantes à la sécheresse aussi bien pour les cultures vivrières que pour les cultures de rente ;
  - ✓ Renforcer la vigilance contre les adventices et les ravageurs des cultures (criquets et autres insectes)
  - ✓ éviter de semer le mil dans les bas-fonds.

### B

- **Cumuls pluviométriques normaux à excédentaires en JJA et JAS**
  - **Installation précoce à normale de la saison des pluies**
  - **Séquences sèches longues en début de saison**
  - **Fin tardive de la saison des pluies**
- ✓ Semer le maïs et le sorgho dans les champs qui peuvent garder l'humidité pendant plusieurs jours sans être inondés;
  - ✓ Privilégier les champs de plateau pour les cultures qui n'aiment pas beaucoup d'eau (mil, sorgho)
  - ✓ Privilégier les champs de bas-fonds pour les cultures qui aiment l'eau (riz pluvial);
  - ✓ Prendre des dispositions pour éviter ou minimiser les dégâts d'éventuelles inondations sur les cultures.

### C

- **Cumuls pluviométriques normaux à excédentaires en JJA et JAS**
  - **Installation normale à tardive de la saison des pluies**
  - **Séquences sèches longues en début de saison**
  - **Fin tardive de la saison des pluies**
- ✓ Utiliser des calendriers prévisionnels des **dates moyennes ou tardives de semis**

- ✓ Investir d'avantage dans **les semences des variétés améliorées à cycle moyen ou court et résistantes à la sécheresse** aussi bien pour les cultures vivrières que pour les cultures de rente
- ✓ Renforcer **la vigilance contre les adventices et les ravageurs** des cultures (criquets et autres insectes)
- ✓ Privilégier **les champs de plateau** pour les cultures qui n'aiment pas beaucoup d'eau (Mil, sorgho, niébé ...)
- ✓ Privilégier les champs de bas-fonds pour les cultures qui aiment l'eau (riz pluvial)
- ✓ prendre des précautions pour éviter ou minimiser les dégâts d'éventuelles inondations

## 2. Elevage

- ✓ Dans les zones à forte probabilité de pluviométrie excédentaire à normale, veiller à éviter de placer ou de conduire les animaux dans les zones inondables (risques de mort par noyade en cas de forte pluie).
- ✓ vacciner les animaux et les parquer dans des enclos situés plus en altitude pour lutter contre les épidémies à cause de la forte humidité pouvant prévaloir;
- ✓ Encourager l'élevage intensif, la culture des plantes fourragères, la fauche des herbacées annuelles pour la constitution d'un stock de fourrage
- ✓ Dans les zones à forte probabilité d'une installation normale à tardive de la saison des pluies ;
- ✓ envisager la mise en place de stocks d'aliment de bétail
- ✓ Faciliter aux animaux l'accès aux points d'eau les plus proches, afin de mettre le bétail à l'abri des effets du manque d'eau et d'éviter les conflits entre agriculteurs et éleveurs ;
- ✓ Concevoir de très bons abris pour volaille à cause des intempéries

## 3. Environnement

Encourager et renforcer les reboisements

## 4. Industrie et commerce

- surveiller les stocks d'eau afin de prendre à temps des décisions pour faire face aux risques de rupture des ouvrages hydrauliques;

- Prendre les mesures nécessaires pour la bonne conservation des aliments.

#### **5. Secteur social/ Gestion des catastrophes/Santé**

- Prendre les dispositions utiles pour éviter ou réduire les dégâts et les pertes liées aux éventuelles inondations dans les zones à risques.
- Renforcer les capacités d'intervention des services techniques et éviter de baisser la garde par rapport au suivi du risque d'inondation dans les zones vulnérables
- Prendre les dispositions utiles pour se protéger contre les moustiques surtout les enfants
- Prévoir la disponibilité des stocks de médicaments antipaludéens surtout dans les zones à accès difficile
- Choléra : accroître la vigilance au moment des premières pluies ;