

MINISTRE DES TRANSPORTS, DE LA MOBILITE
URBAINE ET DE LA SECURITE ROUTIERE

SECRETARIAT GENERAL

AGENCE NATIONALE
DE LA METEOROLOGIE

01 B.P. 576 OUAGADOUGOU 01
TEL: + 226 25-35-60-32

BURKINA FASO

UNITE - PROGRES - JUSTICE

Bulletin Agrométéorologique Décadaire

N°32

Période de référence : du 1er au 10 novembre 2010



SOMMAIRE

- hausse des températures extrêmes de l'air sous abri comparativement à la normale 1981-2010 sur l'ensemble du pays ;
- légère hausse de l'humidité relative de l'air sous abri par rapport à la normale 1981-2010, sur la majeure partie du territoire;
- hausse de l'évapotranspiration potentielle (ETP) et baisse de l'évaporation du BAC Classe « A » comparativement à la normale 1981-2010 sur la majeure ;
- besoins en eau d'irrigation pour quelques cultures de saison-sèche.
- perspectives sur l'évolution de l'ETP climatique et de l'évolution du temps pour la prochaine décennie;
- Suivi de l'évolution de la végétation par satellite.

I Situation climatologique

La deuxième décennie du mois de novembre 2018 a été marquée par la présence d'une activité modérée des vents d'harmattan sur la quasi-totalité du pays. Aussi, des incursions de vent de mousson dans la partie sud-ouest du territoire ont permis de recueillir des hauteurs d'eau de 9.5 mm à la Vallée du Kou, 5.6 mm à Bobo Dioulasso, 13.6 mm à Bérégadougou, 10.4 mm à Gaoua et 15.6 mm à Niangoloko. Les températures maximales ont varié entre 34.9°C à Bobo Dioulasso et 39.0°C à Bitou, tandis que les minimales ont oscillé entre 15.7°C à Kantchari et 24.3°C à Arbinda. Les humidités relatives de l'air sous abri ont évolué de 37% à Gorm-Gorm à 100% à Niangoloko pour les maximales et 11% à Gorm-Gorm à 46% à Bérégadougou pour les minimales. L'évapotranspiration potentielle (ETP) s'est étalée entre 50 mm à Boromo et 68 mm à Dédougou. L'évaporation du bac « A » a varié entre 39 mm à la vallée du Kou et 95 mm à Bogandé.

I.1. Evolution de la température

La deuxième décennie du mois de novembre 2018 s'est caractérisée par des températures maximales sous abri qui ont varié entre 34.9°C à Bobo Dioulasso et 39.0°C à Bitou (fig. a). Comparativement à la moyenne 1981-2010, pour la même période, elles ont été en hausse sur la quasi-totalité du pays. Seules quelques localités des régions du Sud-Ouest et des Cascades ont connu une légère baisse (fig. b).




Fig. a




Fig. b




Fig. c





Fig. d

Pour ce qui est des températures minimales de l'air sous abri, elles ont varié entre 15.7°C à Kantchari dans la province de la Tapoa et 24.3 °C à Arbinda dans l'Oudalan (fig. c). Par rapport à la normale (moyenne 1981-2010), elles ont été en hausse sur tout le territoire (fig. d).

I.2. L'humidité relative de l'air

Au cours de cette décade, l'humidité relative maximale de l'air sous abri a évolué de 37% à Gorm-Gorm dans l'Oudalan et 100% à Niangoloko dans la Comoé (fig. e). Comparativement à la normale (moyenne 1981-2010), elle a été en légère hausse sur la majeure partie du pays, exception faite de quelques zones situées dans la région de l'Est où une légère baisse a été constatée (fig. f).



Quant à l'humidité relative minimale sous abri, elle a oscillé entre 11% à Gorm-Gorm et 46% à Bérégadougou (fig. g). Relativement à la normale 1981-2010, elle a été en hausse sur la

majeure partie du territoire national, seules quelques localités des régions du Sahel, du Centre-Nord et de l'Est ont connu une baisse (fig. h).

Conseils pratiques

- **Attention !** Les températures extrêmes enregistrées dans les bas fonds en cette période sont généralement inférieures de 1 à 2°C à celles observées dans les stations.
- Il faut noter que la température optimale de croissance pour la plupart des variétés de **tomate** se situe entre 21 et 24°C. Ces plantes peuvent supporter un certain intervalle de température, mais en dessous de 10°C et au dessus de 38°C, les tissus des plantes seront endommagés. Leur température optimale de germination se situe entre 16 et 29°C.
- L'avènement de températures extrêmes en cette période pourrait avoir aussi un effet néfaste sur la floraison, la pollinisation et la fructification des tomates et des poivrons. En effet, chez la tomate :
 - ❖ une température supérieure à 35°C entraîne une mise à fruit réduite ;
 - ❖ de 18.5°C à 26.5°C, on a une température optimale pour la mise à fruit ;
 - ❖ par contre une température inférieure à 13°C occasionne le manque ou l'altération de la floraison.
- Pour ce qui concerne les poivrons :
 - ❖ une température supérieure à 32°C le jour entraîne une stérilité du pollen et une chute des fleurs ;
 - ❖ la température optimale pour la mise à fruits est de 16°C ;
 - ❖ par contre en dessous de 15.5°C, on a une mise à fruits médiocre.
- ✚ **Le maïs** est très apte pour les températures de 20 à 25°C, inapte aux températures inférieures à 10°C ou supérieures à 40°C.
- ✚ La température des tubercules dans le sol pour **la pomme de terre**, idéalement, doit être inférieure à 15°C.
- ✚ La température optimale de germination de **l'oignon** est de 18°C.

Au regard de l'évolution des paramètres météorologiques ci-dessus, il est important de noter à l'endroit des producteurs que le **mildiou**, la plus redoutée et la plus célèbre des maladies de la tomate et de la pomme de terre se développe :

- ❖ lorsque l'atmosphère est humide (système d'irrigation par aspersion mise à contribution) et que les températures sont douces à fraîches (comprises entre 17 et 27°C);
- ❖ qu'il se propage par le vent et s'agrippe aux feuilles mouillées. Aussi les pieds de tomates doivent être suffisamment espacés et aérés, afin de garder les feuilles les plus sèches, possible. Dans la mesure du possible, orienter les rangs parallèlement aux vents dominants afin de favoriser une meilleure circulation de l'air propice à l'assèchement du feuillage ;
- ❖ qu'il peut survivre plusieurs années dans le sol ;
- ❖ éviter d'arroser les plants le soir pour éviter que les feuilles restent humides toute la nuit ;
- ❖ installer un système d'arrosage goutte à goutte.

I.3. L'évaporation de l'eau

I.3.1 Situation de la décade

Pour cette deuxième décade du mois de novembre 2018, l'évapotranspiration potentielle (ETP) a oscillé entre 50 mm à Boromo et 68 mm à Dédougou (fig. i). Comparée à la série 1981-2010 pour la même période, l'ETP a connu une hausse sur tout le pays sauf dans certaines zones de la Région du Sahel, du Nord, du Centre-Ouest, du Sud-ouest, de la Boucle du Mouhoun, des Hauts Bassin et des Cascades où une légère baisse a été constatée (fig. j).

Quant à l'évaporation relevée dans le bac de classe «A», elle a été comprise entre 39 mm à la vallée du Kou et 95 mm à Bogandé (fig. k). Comparativement à la moyenne de 1981-2010, elle a été en baisse dans l'ensemble dont les plus fortes baisses ont été enregistrées dans certaines localités de l'Est, du Centre, du Centre-Sud, du Plateau Central, du Nord, de la Boucle du Mouhoun et du Centre-ouest du pays. Par ailleurs, des hausses ont été observées dans certaines zones des régions du Sahel (fig. l).

Par ailleurs, au regard de l'évolution des paramètres météorologiques ci-dessus analysés, nous conseillons aux producteurs d'observer les conditions optimales de pulvérisation des produits phytosanitaires qui sont les suivantes :

Mangues

- ✚ une hygrométrie comprise entre 60 % et 95% ;
- ✚ une vitesse de vent inférieure à 8 km/h (2.2 m/s) ;
- ✚ une température inférieure à 21°C ;

- la pulvérisation de produits phytosanitaires à la température adéquate permet **d'éviter leur évaporation;**
- traiter avec une hygrométrie élevée (supérieure à 60%) notamment lors de la mise en œuvre de produits systémiques appliqués sur le feuillage de préférence le matin ou le soir.
- **Conseils:** compte tenu de la faible disponibilité des ressources en eau et évoluant dans un contexte de changement climatique, il est conseillé aux producteurs qui ont les moyens de songer à l'implantation des systèmes d'irrigation goutte à goutte. Cette technologie permet d'économiser l'eau à travers des goutteurs qui livrent l'eau à petite dose au pied de la culture mais sur un temps étalé.
- L'utilisation de résidus de récoltes pour le paillage du sol et la fumure organique est aussi fortement recommandée.




Fig. i

Fig. j




Fig. k

Fig. l

I.3.2 Situation climatologique de l'évapotranspiration et de l'évaporation « bac »

Cumuls du 1^{er} Décembre au 31 Mars (normales 1981-2010)

stations	ETP(mm)	BAC (mm)
Bobo	845,2	1447,7
Bogande	802,5	1853,0
Boromo	843,5	1406,1
Dedougou	876,4	1705,6
Dori	852,0	1224,4
Fada	852,8	1375,9
Gaoua	734,0	1238,2
Ouaga	785,9	1348,8
Ouahigouya	769,8	1447,7
Po	756,7	1484,3

I.3.3 Besoins en eau d'irrigation

a. Coefficients culturaux de quelques cultures de saison sèche

Culture: Maïs Cycle: 125 jours Besoin en eau: 500 à 800 mm/ cycle

Stade de développement	G-DM (20 jrs)					M-AS (35 jrs)					DE-SGP (40 jrs)					MCG (30 jrs)										
Décade après semis/plantation	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Coefficients culturaux	0.3	0.3	0.32	0.54	0.77	1	1.18	1.2	1.2	1.2	1.17	0.98	0.72	0.55												

G : Germination AS : Apparition des Soies MCG : Maturité Complète des Grains
 DM : Début Montaison DE : Développement de l'Epi
 M : Montaison SGP : Stades Grain Pateux

Culture: Tomate Cycle: 135 jours Besoin en eau: 400 à 800 mm/cycle

Stade de développement	P - DC (30 jrs)			PC-DF (40 jrs)				DF-GF (40 jrs)				MF (25 jrs)		
Décade après semis/plantation	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Coefficients culturaux	0.6	0.6	0.6	0.68	0.8	0.95	1.10	1.15	1.15	1.15	1.15	1.12	1.03	0.90

P : Plantation DF : Début Floraison

Culture: Oignon Cycle: 95 jours Besoin en eau: 350 à 550 mm/cycle

Stade de développement	G-B (20 jrs)		DDF (45 jrs)					FB (20 jrs)		MB (10 jrs)	
Décade après semis/plantation	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Coefficients culturaux	0.7	0.7	0.77	0.89	1	1.05	1	1	1.05	1.01	0.96

G : Germination FB : Formation de la Bulbe
 B : Bourgeonnement MB : Maturation de la bulbe
 DDF: Développement des Feuilles

b. Evaluation des besoins en eau (en mm) maximaux (ETM) de quelques cultures de campagne sèche.

NB : les tableaux ci-dessous représentent les besoins en eau climatiques de chaque culture pour la troisième décade de novembre en fonction du stade dans lequel se trouve la culture.

Pour toute irrigation, tenir compte des caractéristiques des différents types de sols en présence

culture: Maïs		Cycle: 125 jours												
Stations	Décades	ETM (mm/décade) à partir du 1er jour après sémis												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Bobo Dioulasso		17,7	17,7	18,8	31,8	45,4	58,9	70,7	70,7	70,7	68,9	57,7	42,4	32,4
Bogande		17,6	17,6	18,7	31,6	45,0	58,5	70,2	70,2	70,2	68,4	57,3	42,1	32,2
Boromo		15,5	15,5	16,5	27,9	39,7	51,6	61,9	61,9	61,9	60,4	50,6	37,2	28,4
Dédougou		19,2	19,2	20,4	34,5	49,2	63,9	76,7	76,7	76,7	74,8	62,6	46,0	35,1
Dori		15,1	15,1	16,1	27,2	38,7	50,3	60,4	60,4	60,4	58,9	49,3	36,2	27,7
Fada N'gourma		16,2	16,2	17,3	29,2	41,7	54,1	64,9	64,9	64,9	63,3	53,0	39,0	29,8
Gaoua		16,0	16,0	17,0	28,7	41,0	53,2	63,8	63,8	63,8	62,2	52,1	38,3	29,3
Ouagadougou		17,6	17,6	18,8	31,6	45,1	58,6	70,3	70,3	70,3	68,6	57,4	42,2	32,2
Ouahigouya		17,1	17,1	18,2	30,7	43,8	56,9	68,3	68,3	68,3	66,6	55,8	41,0	31,3
Pô		16,6	16,6	17,7	29,8	42,5	55,2	66,2	66,2	66,2	64,6	54,1	39,7	30,4

ETM = Kc* ETo : Besoins en eau maximaux de la culture

culture: Tomate		Cycle: 135 jours													
Stations	Décades	ETM (mm/décade) à partir du 1er jour après plantation													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Bobo Dioulasso		35,3	35,3	35,3	40,1	47,1	56,0	64,8	67,7	67,7	67,7	67,7	66,0	60,7	53,0
Bogande		35,1	35,1	35,1	39,8	46,8	55,6	64,4	67,3	67,3	67,3	67,3	65,5	60,3	52,7
Boromo		31,0	31,0	31,0	35,1	41,3	49,0	56,8	59,3	59,3	59,3	59,3	57,8	53,1	46,4
Dédougou		38,3	38,3	38,3	43,5	51,1	60,7	70,3	73,5	73,5	73,5	73,5	71,6	65,8	57,5
Dori		30,2	30,2	30,2	34,2	40,2	47,8	55,3	57,8	57,8	57,8	57,8	56,3	51,8	45,3
Fada N'gourma		32,5	32,5	32,5	36,8	43,3	51,4	59,5	62,2	62,2	62,2	62,2	60,6	55,7	48,7
Gaoua		31,9	31,9	31,9	36,2	42,6	50,5	58,5	61,2	61,2	61,2	61,2	59,6	54,8	47,9
Ouagadougou		35,2	35,2	35,2	39,8	46,9	55,7	64,5	67,4	67,4	67,4	67,4	65,6	60,4	52,7
Ouahigouya		34,1	34,1	34,1	38,7	45,5	54,1	62,6	65,4	65,4	65,4	65,4	63,7	58,6	51,2
Pô		33,1	33,1	33,1	37,5	44,2	52,4	60,7	63,5	63,5	63,5	63,5	61,8	56,9	49,7

ETM = Kc* ETo : Besoins en eau maximaux de la culture

culture: Oignon		Cycle: 95 jours									
Stations	Décades	ETM (mm/décade) à partir du 1er jour après sémis									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Bobo Dioulasso		41,2	41,2	45,4	52,4	58,9	61,8	61,8	61,8	59,5	56,5
Bogande		41,0	41,0	45,0	52,1	58,5	61,4	61,4	61,4	59,1	56,2
Boromo		36,1	36,1	39,7	45,9	51,6	54,2	54,2	54,2	52,1	49,5
Dédougou		44,7	44,7	49,2	56,9	63,9	67,1	67,1	67,1	64,5	61,3
Dori		35,2	35,2	38,7	44,8	50,3	52,8	52,8	52,8	50,8	48,3
Fada N'gourma		37,9	37,9	41,7	48,1	54,1	56,8	56,8	56,8	54,6	51,9
Gaoua		37,2	37,2	41,0	47,3	53,2	55,9	55,9	55,9	53,7	51,1
Ouagadougou		41,0	41,0	45,1	52,2	58,6	61,5	61,5	61,5	59,2	56,3
Ouahigouya		39,8	39,8	43,8	50,6	56,9	59,7	59,7	59,7	57,5	54,6
Pô		38,6	38,6	42,5	49,1	55,2	58,0	58,0	58,0	55,8	53,0

ETM = Kc* ETo : Besoins en eau maximaux de la culture

Conseils-applications :

- ✚ **disposer du fumier qui est bien décomposé et qui n'est pas trop collant, ni trop humide ; il ne doit pas être trop sec non plus, car il peut s'avérer difficile de réhumidifier le fumier**
- ✚ **mettre en place des brise-vents pour réduire l'assèchement des aménagements**
- ✚ **espacer et adapter les quantités d'eau selon l'infiltration**
- ✚ **optimiser l'arrosage :**
 - ✓ biner, si possible, avant d'arroser ;
 - ✓ arroser tôt le matin, ou en fin d'après-midi ;
 - ✓ arroser au niveau des racines lorsque le sol est sec ;
 - ✓ utiliser, en fonction des plantations, des techniques d'économie d'eau : « goutte à goutte », tuyaux poreux, paillages, etc.

Avantages du compost et du fumier


Ils améliorent la fertilité et la structure du sol et réduisent la nécessité d'appliquer du phosphore (P), de l'azote (N) et du potassium (K). Ils fournissent une diversité d'éléments nutritifs à la culture et peuvent être préparés en 21/2 à 3 mois.

I.4. Suivi de la végétation

Au cours de la deuxième décennie du mois de novembre 2018, la couverture végétale présente une bonne physionomie dans l'ensemble. Elle est quasiment faible dans la zone sahéenne assez bonne dans le reste du pays, particulièrement dans certaines localités de l'ouest et de l'Est du pays où elle est dominée par des ligneux (fig. Ma).

La couverture végétale a été en baisse relativement à la moyenne (2001-2010) sur la majeure partie du pays. Toutefois quelques localités notamment des régions de l'Est, du Sud-ouest, des Hauts-Bassins et de la Boucle du Mouhoun présentent des traits d'une tendance à la hausse (fig. Mb).

Nous encourageons les éleveurs à pratiquer l'élevage intensif ; les déplacements fréquents pour aller chercher l'eau ou la nourriture quand elles manquent affaiblissent les animaux et les exposent aux risques d'infestation.



I.5 Perspectives pour la troisième décennie de novembre 2018

1.5.1 Prévision climatologique de l'ETP

Au cours de la troisième décennie de novembre la demande climatique sera similaire avec une légère hausse par rapport celle de la décennie précédente. Ses valeurs pourraient se varier entre 50 mm à Dori et 64 mm à Dédougou (figure n).





Figure n : Prévision climatologique de l'ETP à la troisième décennie de novembre 2018

1.5.2 Perspectives pour la période du jeudi 22 au mercredi 28 novembre 2018

Au cours de la période allant du 22 au 28 novembre 2018, on observera un renforcement des vents d'harmattan sur le pays. Le ciel sera dans l'ensemble partiellement nuageux et ensoleillé. Les visibilitées seront bonnes sauf dans les grands centres urbains durant les heures crépusculaires où elles pourraient être affectées par de la poussière et de la fumée en suspension.

Les températures maximales varieront entre 34°C et 40°C tandis que les minimales oscilleront entre 18°C et 24°C avec le froid qui sera légèrement ressenti aux petits matins (figures o et p).



Pour cela, il faudra prendre des précautions de protéger les personnes vulnérables contre ces poussières et ces coups de froid qui sont des vecteurs de maladies affectant les voies respiratoires.