



BULLETIN AGROMETEOROLOGIQUE DECADEAIRE



PERIODE : 1 au 10 MOIS : OCTOBRE ANNEE : 2016

SOMMAIRE

- SITUATION METEOROLOGIQUE GENERALE
- SITUATION PLUVIOMETRIQUE
- ETAT D'ALIMENTATION EN EAU DES CULTURES
- BILANS HYDRIQUES
- PERSPECTIVES PLUVIOMETRIQUES
- CONDITIONS HYDRIQUE DES CULTURES Du MAIS ET DU RIZ

NOTE DE PRESENTATION

Les cultures sont influencées par plusieurs éléments météorologiques en fonction de leur stade de développement. L'agriculture ivoirienne est tributaire des conditions météorologiques. Il s'avère donc primordial de mettre à la disposition des acteurs du monde agricole les éléments météorologiques nécessaires pour une meilleure planification des activités agricole en vue de l'amélioration qualitative et quantitative des productions agricoles.

Ce bulletin vise à permettre le suivi régulier de l'évolution générale des conditions agrométéorologiques qui prévalent dans les différentes régions du pays décade après décade, au cours de l'année.

Les données utilisées dans ce bulletin sont issues des stations de mesures réparties sur l'ensemble du pays et des systèmes d'observations de la SODEXAM.

Les éléments agrométéorologiques déterminés grâce aux mesures et observations faites sur les stations et systèmes d'observations donnent des informations très utiles d'une part sur les aspects météorologiques (pluviométrie, température, humidité atmosphérique, rayonnement solaire.) et d'autre part, sur les conditions croissance et de développement des cultures.

Ce bulletin présente également à la fin de chaque décade la situation de la satisfaction des besoins en eau des cultures en fonction des stades de développement (levé, pleine croissance, floraison et fructification) tout en faisant ressortir les quantités d'eau contenues dans les sols et les différents bilans hydriques.

Il comprend un tableau météorologique décadaire résumant des données agrométéorologiques (températures, déficit de saturation, rayonnement global, pluviométrie, d'évapotranspiration potentielle) et des cartes relatives à la situation pluviométrique, aux bilans hydriques et à l'alimentation en eau des cultures.

Pour le calcul des bilans hydriques, la réserve utilise des sols utilisé est de 60 mm sur l'ensemble du territoire. Le spécialiste local connaissant avec précision les capacités de rétention en eau du sol de son exploitation pourrait ajuster les résultats à la réalité de terrain. Toutefois, sur demande un bulletin spécifique peut être édité en fonction des préoccupations.

Le présent bulletin constitue un outil d'aide à la décision pour tous les acteurs du secteur agricole. Plus particulièrement, il permettra aux structures agricoles et aux agents techniques d'encadrement des agriculteurs de mieux planifier les activités agricoles et conduire leur irrigation à partir des données et informations pertinentes.

LEGENDE DES ABREVIATIONS UTILISEES

Températures (degrés et dixième)

- Tx moy** = Moyenne des températures maxi
Journalières
- Tn moy** = Moyenne des températures mini
Journalières
- T moy** = Moyenne des températures extrêmes
Décadaires $(T_x + T_n)/2$
- Txg moy** = Moyenne des températures maxi
Journalières à 5 cm au-dessous du sol
- Tng moy** = Moyenne des températures mini
Journalières à 5 cm au-dessous du sol
- T10=** Moyenne des températures journalières
(relevés de 12h à 10 cm dans le sol)
- T20=** Moyenne des températures journalières
(Relevés de 12h à 20 cm dans le sol)

Humidité – Déficit de Saturation et Vitesse du vent

- U %**=Humidité relative moyenne (%) de 7 h à 17h
- DST=** Déficit de saturation de 7h à 17h $(e_w - e)$
en millibars (mb)
- F=** Vitesse de vent en mètres par seconde (m/s)

Insolation et Rayonnement global

- H=** Durée d'insolation décadaire (en heures)
- Hmoy** = Durée d'insolation décadaire moyenne
(en heures)
- Rg** = Rayonnement Global décadaire en $(\text{en cal}/\text{cm}^2/\text{jour})$

Pluviométrie

- Haut** = Hauteur pluviométrique décadaire (mm)
- Nj** = Nombre de jour de pluie de la décade
- Nj5** = Nombre de jour de pluie \geq à 5 mm
- SS** = nombre maximal de jours consécutifs
sans pluie ou à pluviométrie inférieure à 5 mm

Evapotranspiration et Evaporation

- ETP** = Evapotranspiration potentielle (en mm)

A- REMARQUES :

- 1) Les cumuls de bilans pluviométriques et hydriques climatiques décadaires sont à partir de la 1^{ère} décade du mois de Janvier de l'année en cours.
- 2) De même les bilans hydriques efficaces ont été faits à partir de la 1^{ère} décade du mois de Janvier de l'année en cours.

B- NOTES SUR LE MODELE DE BILAN HYDRIQUE EFFICACE UTILE

- 1) Dans ce modèle l'offre hydrique au début d'une décade donne (i) est calculée en tenant compte de l'état de la réserve hydrique du sol à la fin de la décade $(i-1)$ précédente.
- 1) Les dépenses en eau des cultures sont globalement estimées par la formule $ETM = K_c \cdot ETP$. l'ETP est calculée avec la formule de PENMAN. Les coefficients culturaux (KC) utilisés sont : 0.5 pour les cultures en phase levée ; 0.8 cultures en pleine croissance végétative et 1.2 cultures en floraison ou en fructification.
- 3) Il y a ruissellement et drainage dès que l'offre hydrique potentielle dépasse le seuil de RU fixé

I-SITUATION METEOROLOGIQUE GENERALE

Tableau 1 : valeurs moyennes des éléments météorologiques du 1 au 10 Octobre 2016

	Températures (degrés et dixième)							Humidité Déficit de Saturation et Vitesse du vent			Insolation et Rayonnement global			Pluviométrie et Nbre de jours de pluie			Evapotranspiration et Evaporation (mm)	
	Sous abri (°C)			à 5 cm au-dessus du sol (°C)		Dans le sol (°C)		U (%)	DST (mb)	F (m/s)	H (heure)	H Moy (heure)	Rg (cal/cm2/jour)	Haut (mm)	NJ	NJ5	ETP	ss
	T _x moy	T _n moy	T moy	T _{xg} moy	T _{ng} moy	T ₁₀	T ₂₀											
KORHOGO	31,9	22	27	41,8	21	29,1	29	81	8,70	2	80	74	486,60	12	5	0	48,00	15
ODIENNE	32,6	21,1	26,9			28,3	28,8	84	8,00	1	71	70	459,70	33	6	3	43,90	04
BONDOUKOU	30,7	21,8	26,3	41,6	21,3	30,7	28,2	82	7,70	0	52	54	395,30	62	6	6	37,40	07
BOUAKE	29,4	21,4	25,4	40,1		27,7	27,3	89	4,80	2	38	52	362,60	158	4	4	36,40	04
DALOA-AERO	30,6	20,9	25,8	37,6	18,5	27,9	28,5	90	4,00	0	38	54	322,10	35	5	4	29,80	05
MAN-AERO	31,1	21,4	26,3			28,9	29,3	87	6,90	1	51	60	364,80	125	6	3	35,60	05
DIMBOKRO	33	22,8	27,9	42,7	21,4	28,9	29	85	7,10	0	41	51	372,30	83	5	3	37,40	05
YAMOOUSSOUKRO	31,4	22,3	26,9	40,8	21,3	28,8	28,8	86	7,40	2	42	50	375,90	35	3	1	40,60	08
GAGNOA	31,7	21,9	26,8	46,9	21,6	29,6	29,4	87	6,40	1	47	51	360,60	67	4	3	35,90	05
ADIAKE	29,9	23	26,5	39,1	23,1	28,7	28,8	90	4,60	1	35	42	314,40	93	8	5	31,30	04
ABIDJAN	29,2	24,7	27	40,2	22,8	31,2	29,8	88	4,40	3	47	57	354,10	32	5	3	36,60	04
SASSANDRA	29,4	24,5	27	47,7	24	31,9	30,5	87	5,70	1	62	61	403,80	16	5	2	38,60	08
SAN-PEDRO	29	24,7	26,9	43,4	23,1	29,9	29,8	90	4,50	4	60	52	397,60	7	4	0	41,10	20
TABOU	27,6	23	25,3	41	22,7	28,8	28,5	89	2,20	2	54	48	377,90	99	7	2	34,00	06

La décade est marquée par des quantités de pluies allant de 7 à 158mm sur l'ensemble du territoire. La température moyenne a varié de 25,3°C (Tabou) à 27,9°C (Dimbokro) sur l'ensemble du pays, les températures maxi et mini ont varié respectivement de 33°C (Dimbokro) à 27,6°C (Tabou) et de 24,7°C (Abidjan) à 20,9°C (Daloa). L'humidité de l'air a varié de 81 à 90 % sur le continent et de 87 à 90% sur le littoral. La durée d'insolation décadaire est en progression dans la majeure partie du pays par rapport à la normale décadaire. Des séquences sèches de plus en plus longues sont observées dans les localités de San Pedro, Sassandra, Yamoussoukro et Korhogo.

II-SITUATION PLUVIOMETRIQUE

Cette décade est caractérisée par des quantités de pluie importantes sur l'ensemble du pays à l'exception de San Pedro et Korhogo où les cumuls décadaires n'ont pas atteint 20mm de pluie. Les hauteurs pluviométriques sont déficitaires dans les localités du Nord, et de l'Ouest (Fig2). Le cumul pluviométrique varie de 700 mm à 1800 mm dans l'ensemble des régions du pays (Fig3). Ce cumul pluviométrique est excédentaire par rapport à l'année dernière dans les localités du Nord, Centre-ouest, Sud-ouest du pays. (Fig.4)

2.1 Pluviométrie décadaire




Fig1 : Pluviométrie totale (mm) du 1 au 10 Octobre 2016




Fig2 : Ecart entre la pluviométrie (mm) du 1 au 10 Octobre 2016 et du 1 au 10 Octobre 2015

2.2 Cumul pluviométrique




Fig3 : Cumul pluviométrique (mm) du 1 janvier au 10 Octobre 2016




Fig4 : Ecart entre Cumuls pluviométriques du 1 janvier au 10 Octobre 2016 et du 1 janvier au 10 Octobre 2015

III. ETAT D'ALIMENTATION EN EAU DES CULTURES


Les besoins en eau des cultures ont été satisfaisants au cours de la décade dans toutes les localités.



Fig 5 : ISBE des cultures annuelles en début de croissance végétative ou en maturité

Fig 6 : ISBE des cultures annuelles en pleine croissance végétative

Fig 7 : ISBE des cultures annuelles en phase reproductrice ou cultures pérennes



3.1. Bilans hydriques

La majorité des sols contiennent de l'eau pour assurer les besoins en eau durant la prochaine décade. Les sols des localités du Nord-Ouest, de l'ouest, et de l'Est ont atteint la capacité au champ. Le bilan hydrique climatique est déficitaire du Centre jusqu'au littoral à l'exception des localités du Nord, Ouest et de Tabou (fig.9).




Fig. 08 : Réserve en eau des sols (mm) de RU= 60 mm




Fig. 9 : Bilan hydrique climatique (mm) du 1 au 10 Octobre 2016

IV. PERSPECTIVE PLUVIOMETRIQUE

Les prévisions de la pluviométrie du 13 à l'indiquent des quantités de pluies allant 10 à 150mm.




Figure 10 : prévision de la pluviométrie du 13 au 20 Octobre 2016 (source : NOAA, climate Prédiction Center)

SYNTHESE

Les offres hydriques disponibles (pluies tombées et réserves en eau des sols) ont pu satisfaire les besoins en eau des cultures quel que soit le stade de développement.

Les quantités d'eau disponibles dans les sols dans la majeure partie des localités du pays sont suffisantes pour assurer l'alimentation en eau des cultures durant la prochaine décade sauf dans les zones du littoral et au Centre Nord.

Nous conseillons aux paysans de respecter les consignes des agents de vulgarisations quant aux dosages des produits phytosanitaires et d'éviter les traitements pendant les jours pluvieux pour éviter le lessivage.

Favoriser les techniques de conservations d'eau du sol.

6. CONDITIONS HYDRIQUE DES CULTURES DU MAÏS ET DU RIZ

6.1 Situation hydrique du 1 au 10 Octobre 2016

TABLEAU 2 : Indice moyen de satisfaction des besoins en eau de la culture du Maïs de 4 mois (120 jours) du 1 au 10 Octobre 2016

JOURS APRES SEMIS	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120
BONDOUKOU												
DALOA												
DIMBOKRO												
YAMOOUSSOUKRO												
GAGNOA												
ADIAKE												
ABIDJAN												
SASSANDRA												
SAN PEDRO												
TABOU												
ODIENNE												
MAN												
BOUAKE												
KORHOGO												

Tableau 3 : Indice moyen de satisfaction des besoins en eau de la culture du Riz 4 mois (120 jours) du 1 au 10 Octobre 2016

JOURS APRES SEMIS	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120
BONDOUKOU												
DALOA												
DIMBOKRO												
YAMOOUSSOUKRO												
GAGNOA												
ADIAKE												
ABIDJAN												
SASSANDRA												
SAN PEDRO												
TABOU												
ODIENNE												
MAN												
BOUAKE												
KORHOGO												

STRESS HYDRIQUE

PAS DE STRESS HYDRIQUE

Les besoins en eau des cultures du maïs et du riz quelques soit le stade de développement ont été comblés.

6.2 Situation hydrique du 11 au 20 Octobre 2016 (prochaine décade)

Tableau 4 : Besoins moyens en eau (mm) de la culture du Maïs du 11 au 20 Octobre 2016

JOURS APRES SEMIS	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120
BONDOUKOU	11	11	11	19	26	37	45	45	45	37	26	19
DALOA	9	9	9	15	21	30	36	36	36	30	21	15
DIMBOKRO	11	11	11	19	26	37	45	45	45	37	26	19
YAKRO	12	12	12	20	28	41	49	49	49	41	28	20
GAGNOA	11	11	11	18	25	36	43	43	43	36	25	18
ADIAKE	9	9	9	15	21	30	36	36	36	30	21	15
ABIDJAN	11	11	11	18	26	37	44	44	44	37	26	18
SASSANDRA	12	12	12	19	27	39	46	46	46	39	27	19
SAN PEDRO	12	12	12	21	29	41	49	49	49	41	29	21
TABOU	10	10	10	17	24	34	41	41	41	34	24	17
ODIENNE	13	13	13	22	31	44	53	53	53	44	31	22
MAN	11	11	11	18	25	36	43	43	43	36	25	18
BOUAKE	11	11	11	18	25	36	44	44	44	36	25	18
KORHOGO	14	14	14	24	34	48	58	58	58	48	34	24

Tableau 5 : Besoins moyens en eau (mm) de la culture du Riz du 11 au 20 Octobre 2016

<i>JOURS APRES SEMIS</i>	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120
BONDOUKOU	26	26	30	30	37	45	45	45	37	30	26	19
DALOA	21	21	24	24	30	36	36	36	30	24	21	15
DIMBOKRO	26	26	30	30	37	45	45	45	37	30	26	19
YAKRO	28	28	32	32	41	49	49	49	41	32	28	20
GAGNOA	25	25	29	29	36	43	43	43	36	29	25	18
ADIAKE	21	21	24	24	30	36	36	36	30	24	21	15
ABIDJAN	26	26	29	29	37	44	44	44	37	29	26	18
SASSANDRA	27	27	31	31	39	46	46	46	39	31	27	19
SAN PEDRO	29	29	33	33	41	49	49	49	41	33	29	21
TABOU	24	24	27	27	34	41	41	41	34	27	24	17
ODIENNE	31	31	35	35	44	53	53	53	44	35	31	22
MAN	25	25	28	28	36	43	43	43	36	28	25	18
BOUAKE	25	25	29	29	36	44	44	44	36	29	25	18
KORHOGO	34	34	38	38	48	58	58	58	48	38	34	24