

Servicio Nacional de Estudios Territoriales

BOLETÍN AGROMETEOROLÓGICO DECÁDICO No. 34 DEL 01 AL 10 DICIEMBRE DE 2005



DESARROLLO DE PANOJA, SORGO, SAN NICOLÁS, SAN VICENTE

SAN SALVADOR, EL SALVADOR, DICIEMBRE, 2005

ÍNDICE

		Pág.
1	Evaluación de la humedad en la 1ª década de diciembre	2-3
2	Figura 1: Disponibilidad hídrica del periodo.	3
3	Comportamiento probable para el próximo periodo.	4
4	Figura 2: Comportamiento de las temperaturas extremas y la humedad relativa promedio.	4
5	Figura 3: Comportamiento de las temperaturas mínimas diarias en lugares arriba de los 850 m.s.n.m. (diciembre).	5
6	Figura 4: Comportamiento de las temperaturas máximas diarias en lugares abajo de los 350 m.s.n.m. (diciembre).	5-6
7	Figura 5: Comportamiento de las temperaturas de suelo diarias a 2 cms de profundidad (diciembre)	6
8	Figura 6: Comportamiento de la luz solar (diciembre)	7
9	Figura 7: Comportamiento de la lluvia acumulada (diciembre)	7-8
10	Cuadro resumen: Comportamiento de los cultivos	9-10

1. EVALUACIÓN DE LA HUMEDAD EN LA 1ª DÉCADA DE DICIEMBRE

Zona	Lugares	Condiciones de humedad	Observaciones
Occidental	Cordillera Central (Apaneca, volcán de Santa Ana), zona norte montañosa. Valles de Santa Ana y Ahuachapán alrededores del lago de Guija, zona de Candelaria de la frontera	Déficit ligero Déficit moderado	Se presentaron lluvias débiles en el río Paz (< 10 mm)
Central y Paracentral	Zona montañosa norte de Chalatenango Cordillera central (Bálsamo, San Vicente y cabañas) valles intermedios (San Andrés) Litoral costero	Déficit ligero Déficit moderado	Se presentaron lluvias débiles en Puente Cuscatlan y Sensuntepeque (< 10 mm)
Oriental	Zona norte montañosa de Morazán y La Unión Zonas montañosas intermedias y valles intermedios Planicies costeras y internas	Déficit ligero Déficit moderado Déficit moderado	Se presentaron lluvias débiles en San Francisco Gotera (< 10 mm)

Conceptos:

Década: Periodo de diez días consecutivos utilizados en el estudio del comportamiento de los factores meteorológicos y su relación con la agricultura de un lugar.

Condición de humedad ó Índice de humedad (Ih): Es la relación entre la lluvia y la evapotranspiración potencial ($Ih = \text{lluvia}/\text{ETP}$). Entre mayor es la condición, indica mayor humedad y entre menor sea indica déficit.


Condición de humedad	Rango
Déficit extremo ó Muy seco	0.0 – 0.2
Déficit ligero ó Seco	0.2 – 0.5
Adecuada ó normal	0.5 – 1.5
Exceso ligero ó Húmedo	1.5 – 2.5
Exceso moderado ó Muy húmedo	> 2.5

Evapotranspiración potencial (ETP): Es la cantidad máxima de agua capaz de ser perdida por una capa continua de vegetación que cubre todo el terreno, cuando es ilimitada la cantidad de agua suministrada al suelo.

2. FIGURA 1: DISPONIBILIDAD HÍDRICA DEL PERIODO

En la presente década se presentaron algunas lluvias débiles aisladas, se establecen condiciones de déficit en todo el país. Según los balances hídricos climáticos los almacenamientos para todas las zonas del país son deficitarios ó sea la disponibilidad de agua en los suelos tiende a irse reduciendo. Esta condición actual de déficit ligero es normal para el mes de diciembre ya que nos encontramos en la estación seca.

La siguiente figura muestra para algunas estaciones representativas de las diferentes zonas del país, la normal climatológica de la Evapotranspiración Potencial (ETP) y la lluvia para la presente década, se observa que la ETP es mayor que la lluvia de los diez días de esta década lo que significa que la humedad en el suelo es deficitaria para el presente periodo.



3. COMPORTAMIENTO PROBABLE PARA EL PRÓXIMO PERÍODO

Para el próximo periodo (11 al 20 diciembre 2005) se espera una disminución gradual en la humedad de los suelos, debido al término de la estación lluviosa, también se espera la influencia de frentes fríos, lo cual producirá vientos moderados y una disminución en las temperaturas, algunas lluvias aisladas podrían presentarse.

Humedad del suelo pronosticada para el próximo periodo


Zonas del país	Humedad del suelo pronosticada
Zona norte y cadena montañosa	Déficit ligero a moderado
Zona central (valles intermedios)	Déficit ligero a moderado
Zona sur (litoral costero)	Déficit moderado

4. FIGURA 2: COMPORTAMIENTO DE LAS TEMPERATURAS EXTREMAS Y LA HUMEDAD RELATIVA PROMEDIO (01-10 DICIEMBRE).

En la siguiente figura, se muestra el comportamiento de las temperaturas máximas y mínimas promedio y la humedad relativa, registradas en siete estaciones representativas de las diferentes regiones climáticas del país para el presente período.


El mayor promedio de temperatura máxima se registro en San Miguel con 35.4 °C, siendo este menor que la normal mensual de diciembre (35.6 °C), en cambio el menor promedio de temperatura mínima es para Los Naranjos con 12.7 °C, la cual tiende a ser mayor que el promedio normal mensual (11.4 °C).

El menor promedio de humedad relativa se registró en Chorrera del Guayabo con 66 %, siendo esta mayor a la normal climatológica mensual (65 %). La temperatura mínima absoluta fue de 7.6 °C y se registró en el valle de Los Naranjos el día 5 de diciembre y la temperatura máxima absoluta fue de 36.6 °C y se registró en San Miguel y Chorrera del Guayabo el día 6 del mismo mes.




5. FIGURA 3: COMPORTAMIENTO DE LAS TEMPERATURAS MÍNIMAS DIARIAS EN LUGARES ARRIBA DE LOS 850 MSNM (01-10 DE DICIEMBRE/2005)

En la siguiente figura se muestra el comportamiento diario de las temperaturas mínimas para estaciones climatológicas que se encuentran arriba de los 850 msnm. Se puede observar que las temperaturas mas bajas se registraron en diferentes días, para el día 2 en Cojutepeque, día 4 en Santiago de Maria, día 5 en Los Naranjos y día 7 en Perquín, las temperaturas aumentaron al final de la década, la década anterior fue mas fría con respecto a la presente.




6. FIGURA 4: COMPORTAMIENTO DE LAS TEMPERATURAS MÁXIMAS DIARIAS EN LUGARES ABAJO DE LOS 350 MSNM (01-10 DE DICIEMBRE/2005)

En la siguiente figura se muestra el comportamiento diario de las temperaturas máximas para estaciones climatológicas que se encuentran abajo de los 350 msnm. Se puede observar que el día 2 se da la temperatura más alta en Nueva Concepción, el día 9 en Acajutla y el día 10 en San Miguel y Chorrera del Guayabo, se observa una disminución de las temperaturas máximas los días 5 y 9 de la década, la estabilidad atmosférica continúa.




7. FIGURA 5: COMPORTAMIENTO DE LAS TEMPERATURAS DEL SUELO DIARIAS PARA 2 CMS DE PROFUNDIDAD (01-10 DE DICIEMBRE/2005)

En la siguiente figura se muestra el comportamiento diario de las temperaturas del suelo para 2 cms de profundidad en estaciones climatológicas que se encuentran a diferentes alturas. Se puede observar que estas son menores el día 9 de diciembre para Ahuachapán y Nueva Concepción, estas dos estaciones presentan mayor variabilidad en la década, la máxima temperatura se registró en Nueva Concepción el día 9.



8. FIGURA 6: COMPORTAMIENTO DE LAS HORAS DE LUZ SOLAR PARA 3 ESTACIONES (01-10 DE DICIEMBRE/2005)

El comportamiento diario de las horas de luz solar para tres estaciones climatológicas, las cuales están ubicadas en la zona costera, el valle central y la planicie oriental, la variación en la insolación es de 8.1 a 10.0 horas, el día con mayor número de horas luz fue el día 7 en la zona central y el menor el día 10 en la misma zona.




9. FIGURA 7: COMPORTAMIENTO DE LA LLUVIA ACUMULADA (A DICIEMBRE/2005)

En la siguiente figura se muestra el comportamiento acumulado de lluvia hasta la fecha en veinte estaciones representativas de las diferentes regiones climáticas del país. Se puede observar que a la fecha todas las estaciones superan la normal climatológica.

Para la trigésima cuarta década del año, la máxima acumulación durante el año se presenta en Perquín departamento de Morazán con 2881 mm el cual supera el promedio normal (2302 mm) a la fecha, la máxima acumulación de lluvia para la presente década se registró en Sensuntepeque con 14.5 mm.

En términos generales se puede afirmar que el régimen de lluvia para la presente década fue deficitario para todo el país, esto es normal debido a que la estación lluviosa a terminado y nos encontramos la estación seca.



10. INFORMACIÓN DE LOS CULTIVOS EN EL PRESENTE PERIODO.

A continuación se presenta la situación y estado actual de los cultivos en las diferentes zonas de El Salvador. Esta información es elaborada por el SNET.

REGION OCCIDENTAL

Lugares de observación	Cultivo	Fase fenológica	Observaciones
San Andrés	Maíz de primera	Cosecha final	Cultivos en buen estado
Santa Ana	Sorgo	Desarrollo y maduración de grano	
Ahuachapán	Café	Maduración de grano y cosecha	
Salcoatitán	Caña de azúcar	Floración plena, zafra y preparación de tierras para siembra	
Acajutla	Aguacate	Floración inicial y plena	Árboles en buen estado
	Papayo	Desarrollo y maduración de frutos	
	Carao	Desarrollo final de frutos	
	Copinol	Inicio de maduración de frutos	
	Sunza	Pleno desarrollo de frutos	
	Almendra de río	Desarrollo final de frutos	
	Flor de fuego	Maduración de frutos	
	Limón	Desarrollo y maduración de frutos	
	Naranja	Desarrollo de frutos, maduración y cosecha	
	Mandarina	Maduración de frutos y cosecha	
	Teca	Maduración de frutos	
	Caoba	Desarrollo de frutos	
	Llama del bosque	Floración y desarrollo de frutos	
	Tamarindo	Desarrollo final de frutos	
	Cedro	Desarrollo de frutos	
	Casuarina	Desarrollo de frutos	
	Júpiter de java	Maduración de frutos	
	Campanilla	Floración plena	
	Pascua	Floración plena	
	Eucalipto	Desarrollo de frutos	
	San Andrés	Floración plena	
	Mango	Aparición de hojas nuevas y floración	
	Achiote	Desarrollo y maduración de frutos	

